

PROTOCOLS D'ACTUACIÓ PER A PROFESSIONALS SANITARIS SEGONS DIFERENTS ESCENARIS

ESCENARI 2:

Professionals sanitaris asimptomàtics que han tingut contacte directe amb un cas COVID-19 sense utilitzar EPIs



Exposició de **baix risc**

Exposició puntual, amb mínim contacte físic i durant un temps inferior a 15 minuts, com ara atenció domiciliària o seguiment del pacient a l'habitació.

- Continuar amb l'activitat assistencial habitual.
- Treballar amb mascareta quirúrgica durant tota la jornada laboral.
- Cal fer control diari de símptomes durant 14 dies i consultar si hi apareixen.
- Si roman asimptomàtic, no està indicat fer prova RT-PCR.



Exposició d'**alt risc**

Realització de procediments com frotis o aspirat nasofaringi, intubació, broncoscopia, aspiració de secrecions respiratòries, maniobres de reanimació sense utilització d'EPI.

- Aïllament domiciliari i control diari de símptomes.
- Realització de PCR als 7 dies de l'exposició, si roman asimptomàtic.
 - Si la PCR és negativa, reincorporació al lloc de feina amb mascareta quirúrgica i vigilància de símptomes fins als 14 dies del contacte i abstenir-se d'atendre a pacients immunodeprimits.
 - Si la PCR és positiva, es procedirà segons s'ha explicat en l'escenari 1.

Aquesta informació pot canviar depenent de l'evolució del coneixement de la Pandèmia.